


# Microkinésithérapie

Le portail de la Microkinésithérapie



[TROUVER UN THÉRAPEUTE](#)

[TROUVER UNE FORMATION](#)

[MICROKINÉSITHÉRAPIE À L'INTERNATIONAL](#)

## Bienvenue

Bienvenue sur le site de la microkinésithérapie

## Bénéficiaire

[Comment se déroule une séance](#)

[Tarifs des séances](#)

[Qualité des praticiens](#)

[Trouver un microkinésithérapeute](#)

[La microkiné à l'international](#)

## Comprendre

[Définition et présentation](#)

[Les auteurs](#)

[Articles parus dans des revues spécialisées](#)

[Ouvrages sur la microkinésithérapie](#)

[Ouvrages tous publics](#)

[Ouvrages pour les professionnels](#)

[Congrès de microkinésithérapie - 2012](#)

[Congrès de microkinésithérapie - 2010](#)

[Travaux scientifiques : évaluations](#)

## Apprendre

[Le Centre de Formation à la microkinésithérapie](#)

[Les formations en microkinésithérapie](#)

[Conditions d'inscription](#)

[Programme de formation](#)

[Tarif des stages](#)

[Demande de dossier d'inscription](#)

[Règlement intérieur](#)

[Code d'exercice](#)

[Conseil de l'ordre](#)

## Login Form

Identifiant

Mot de passe

## COLOPATHIE FONCTIONNELLE

### COMPTE RENDU D'ÉVALUATION

**SUJET :** COLOPATHIE FONCTIONNELLE

**VALEUR DE L'ÉTUDE :** Grade A

**NOMBRE DE SUJET :** 61

**MÉTHODOLOGIE :** double aveugle, par tirage au sort. Evaluation effectuée par le professeur Chef de Service

**LIEU DE L'ÉTUDE :** CHU BESANCON – Service de gastro-antérologie

**ANNÉE :** 1982-1983

**NOMBRE DE THÉRAPEUTES AYANT PARTICIPÉ :** 2

**AUTEUR :** Professeur CARAYON P, GROSJEAN Daniel, BENINI Patrice

**RÉSULTATS :** amélioration groupe traité : 74 % Amélioration groupe placebo : 38 %  $P \leq 0,01$  Résultats sans changement après une 2e séance.

**RÉSUMÉ :** 61 personnes atteintes de colopathie fonctionnelle et sélectionnées par le Professeur CARAYON ont été réparties par tirage au sort entre 1 groupe traité (31) et 1 groupe placebo (30). L'évaluation s'est fait en double aveugle. Les critères de jugement, 1 mois après la séance de microkinésithérapie, sont pour chacun des symptômes présents dans le bilan de départ : disparus ou améliorés = résultat positif, stables ou aggravés = résultat négatif Il en est de même pour les signes cliniques constatés à l'examen initial. Résultat : 1a 1ère séance 61 malades inclus, 1 retiré (début de cancer)

**PLACEBO MICROKINESITHERAPIE TOTAL**

Amélioration 11 (18,3 %) 23 (38,3 %) 34 (56,6 %)

Sans effet 18 (30 %) 8 (13,3 %) 26 (43,6 %)

Total 29 (48,3 %) 31 (51,6 %) 60 (100 %)

Les sujets ayant eu un traitement en microkinésithérapie sont nettement améliorés par rapport au placebo ( $\chi^2 = 6,61$  ;  $p = 0,010$ )

La 2e séance ne montre pas de modification par rapport à la 1ère séance. 59 inclus (1 à quitté la région).

**PLACEBO MICROKINESITHERAPIE TOTAL**

Amélioration 11 (18,3 %) 23 (38,9 %) 34 (57,6 %)

Sans effet 17 (28,8 %) 8 (13,5 %) 25 (42,3 %)

Total 28 (47,5 %) 31 (52,5 %) 59 (100 %)

Les sujets ayant reçu un traitement en microkinésithérapie sont nettement améliorés par rapport au placebo ( $\chi^2 = 5,98$  ;  $p = 0,014$ ). Il n'a pas été observé d'aggravation.