


# Microkinésithérapie

Le portail de la Microkinésithérapie



[TROUVER UN THÉRAPEUTE](#)

[TROUVER UNE FORMATION](#)

[MICROKINÉSITHÉRAPIE À L'INTERNATIONAL](#)

## Bienvenue

Bienvenue sur le site de la microkinésithérapie

## Bénéficiaire

[Comment se déroule une séance](#)

[Tarifs des séances](#)

[Qualité des praticiens](#)

[Trouver un microkinésithérapeute](#)

[La microkiné à l'international](#)

## Comprendre

[Définition et présentation](#)

[Les auteurs](#)

[Articles parus dans des revues spécialisées](#)

[Ouvrages sur la microkinésithérapie](#)

[Ouvrages tous publics](#)

[Ouvrages pour les professionnels](#)

[Congrès de microkinésithérapie - 2012](#)

[Congrès de microkinésithérapie - 2010](#)

[Travaux scientifiques : évaluations](#)

## Apprendre

[Le Centre de Formation à la microkinésithérapie](#)

[Les formations en microkinésithérapie](#)

[Conditions d'inscription](#)

[Programme de formation](#)

[Tarif des stages](#)

[Demande de dossier d'inscription](#)

[Règlement intérieur](#)

[Code d'exercice](#)

[Conseil de l'ordre](#)

## Login Form

Identifiant

Mot de passe

## Migraine

### COMPTE RENDU D'ÉVALUATION

**SUJET :** MIGRAINE

**VALEUR DE L'ÉTUDE :** B

**NOMBRE DE SUJET :** 31

**MÉTHODOLOGIE :** Auto-questionnaire portant sur le nombre de crises et sur l'intensité de la crise de 0 la plus faible à 10 la plus forte. Résultat recueilli à J+30 et un autre à J+75 (avec ou sans 2e séance).

**LIEU DE L'ÉTUDE :** Cabinet libéral en France et en Suisse

**ANNÉE :** 2006-2007

**NOMBRE DE THÉRAPEUTES AYANT PARTICIPÉ :** 2

**AUTEUR :** Michèle BETTENBOURG

**RÉSULTATS :** La douleur est passée de 7 à 4,3 puis à 3,2 au 3e questionnaire et le nombre de crises de 8 à 3 par mois puis de 3 à 2 au 3e questionnaire.

**RÉSUMÉ :**

n = 31

femme 27 = 87 %

homme 4 = 13 %

Age = 44 ans (14 à 80 ans)

Ancienneté des migraines : 18 ans et 4 mois (8 mois à 57 ans)

Moyenne des crises : 8 par mois (3 par an à 1 tous les jours)

Durée moyenne : de 15 h à 4 jours

Syndromes associés :

nausées 71 %

Vomissement 45 %

Sensibilité aux sons 87 %

Sensibilité à la lumière 94%

Sensibilité aux mouvements de la tête 87%

Avec traitement de fond 23 %

Avec traitement de la crise 81%

A	Douleur	Nombre de crises	Efficacité selon les patients
J. 0	7 / 10	8 / mois	
J + 30	4,3 / 10	3 / mois	
J + 75 Avec ou sans 2 <sup>e</sup> séance	3,2 %	2 / mois	75 %