

# Microkinésithérapie

Le portail de la Microkinésithérapie



[TROUVER UN THÉRAPEUTE](#)

[TROUVER UNE FORMATION](#)

[MICROKINÉSITHÉRAPIE À L'INTERNATIONAL](#)

## Bienvenue

Bienvenue sur le site de la microkinésithérapie

## Bénéficiaire

[Comment se déroule une séance](#)  
[Tarifs des séances](#)  
[Qualité des praticiens](#)  
[Trouver un microkinésithérapeute](#)  
[La microkiné à l'international](#)

## Comprendre

[Définition et présentation](#)  
[Les auteurs](#)  
[Articles parus dans des revues spécialisées](#)  
[Ouvrages sur la microkinésithérapie](#)  
[Ouvrages tous publics](#)  
[Ouvrages pour les professionnels](#)  
[Congrès de microkinésithérapie - 2012](#)  
[Congrès de microkinésithérapie - 2010](#)  
[Travaux scientifiques : évaluations](#)

## Apprendre

[Le Centre de Formation à la microkinésithérapie](#)  
[Les formations en microkinésithérapie](#)  
[Conditions d'inscription](#)  
[Programme de formation](#)  
[Tarif des stages](#)  
[Demande de dossier d'inscription](#)  
[Règlement intérieur](#)  
[Code d'exercice](#)  
[Conseil de l'ordre](#)

## Login Form

Identifiant

Mot de passe

## RÉGURGITATION CHEZ LES NOUVEAUX NÉS

### COMPTE RENDU D'ÉVALUATION

**SUJET :** RÉGURGITATION CHEZ LES NOUVEAUX NÉS

**VALEUR DE L'ÉTUDE :** Grade C

**NOMBRE DE SUJET :** 8

**MÉTHODOLOGIE :** Questionnaire rempli par les parents

**LIEU DE L'ÉTUDE :** Cabinet libéral

**ANNÉE :** 2003

**NOMBRE DE THÉRAPEUTES AYANT PARTICIPÉ :** 1

**AUTEUR :** Laurent CALDERARA

**RÉSULTATS :** Amélioration de 68 % en moyenne

**RÉSUMÉ :** Les parents de 8 enfants, qui souffraient de régurgitation, ont rempli un questionnaire portant sur le nombre de biberons régurgités par l'enfant dans les jours qui ont précédé la séance de microkinésithérapie et 15 jours après.

Les résultats portent sur le nombre de biberons régurgités par rapport au nombre de biberons bus.

À J0, 34 sur 37 soit 92 %

À J + 15, 9 sur 37 soit 24%

=>L'amélioration est de 68 % en moyenne

L'amélioration est de :

50 % dans 25 % des cas,

75 % dans 37,5 % des cas

100 % dans 37,5 % des cas.